

第 52 回 南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会  
第 430 回 地震防災対策強化地域判定会

# 気 象 庁 資 料



令和 4 年 2 月 7 日

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

## 令和4年1月1日～令和4年1月31日の主な地震活動

### ○南海トラフ巨大地震の想定震源域およびその周辺の地震活動：

【最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震及びその他の主な地震】

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発生場所
1/7	01:59	和歌山県南部	52	3.8	2	フィリピン海プレート内部
1/18	08:16	遠州灘	35	3.6	2	フィリピン海プレート内部
1/19	03:34	日向灘	47	3.9	1	フィリピン海プレート内部
1/22 ～	1/22 01:08	日向灘	45	6.6	5強	フィリピン海プレート内部
	・上記の地震とほぼ同じ場所で、1月22日01時08分以降、M3.5以上の地震が30回（上記の地震を含む）発生している（1月31日24時現在）。					
1/29	10:59	和歌山県北部	6	3.7	3	地殻内
1/30	08:26	奈良県	45	3.6	2	フィリピン海プレート内部

※震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。

※太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。

### ○深部低周波地震（微動）活動期間

四国	紀伊半島	東海
<b>■四国東部</b> 1月1日～2日 1月5日～7日 1月10日～13日 1月16日～19日 1月22日～24日 1月26日～30日  <b>■四国中部</b> 12月29日～1月1日  <b>■四国西部</b> <u>12月28日～1月17日</u> ……(1) 1月19日 1月21日～22日 1月24日 1月26日～27日 1月30日～（継続中）	<b>■紀伊半島北部</b> 1月10日 1月13日  <b>■紀伊半島中部</b> 1月15日～16日 1月30日～（継続中）  <b>■紀伊半島西部</b> 1月7日～11日 1月13日 1月16日～17日	<u>1月14日～（継続中）</u> ……(2)


※深部低周波地震（微動）活動は、気象庁一元化震源を用い、地域ごとの一連の活動（継続日数2日以上または活動日数1日の場合で複数個検知したもの）について、活動した場所ごとに記載している。

※ひずみ変化と同期して観測された深部低周波地震（微動）活動を赤字で示す。

※上の表中（1）、（2）を付した活動は、今期間、主な深部低周波地震（微動）活動として取り上げたものの。

気象庁作成


## 概況に記載している深部低周波地震(微動)の活動の場所



領域はObara(2010)を参考に作成。

出典 : Obara, K. (2010), Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan: Spatiotemporal characteristics and segmentation, *J. Geophys. Res.*, 115, B00A25, doi:10.1029/2008JB006048.

# 南海トラフ沿いとその周辺の広域地震活動(2022年1月1日～2022年1月31日)




- ・ 図中の吹き出しは、南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺で最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震、それ以外の陸域M5.0以上・海域M6.0以上とその他の主な地震。
- ・ 震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。
- ・ 発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

# 南海トラフ沿いとその周辺の発震機構解

Period:2022/01/01 00:00—2022/01/31 24:00



# 南海トラフ沿いとその周辺の発震機構解 (2)




(下半球投影)  
[気象庁作成]


# 1月22日 日向灘の地震

## 震央分布図

(1997年10月1日～2022年1月31日、  
深さ0～80km、 $M \geq 2.0$ )  
2022年1月22日以降の地震を赤く表示  
図中の発震機構解はCMT解




## 領域a内の断面図 (A-B投影)



## 震央分布図

(1919年1月1日～2022年1月31日、  
深さ0～100km、 $M \geq 5.0$ )  
2022年1月22日以降の地震を赤く表示





2022年1月22日01時08分に日向灘の深さ45kmで $M 6.6$ の地震 (最大震度5強)が発生した。この地震はフィリピン海プレート内部で発生した。発震機構 (CMT解) は西北西-東南東方向に張力軸を持つ型である。今回の地震発生以降、ややまとまった活動となっている。


1997年10月以降の活動をみると、今回の地震の震源付近 (領域b) では $M 5.0$ 以上の地震が時々発生している。そのうち、2006年3月27日には $M 5.5$ の地震 (最大震度5弱)が発生している。

1919年以降の活動をみると、今回の地震の震央を含む日向灘周辺 (領域c) では、 $M 7.0$ 以上の地震が時々発生している。「1968年日向灘地震」 ( $M 7.5$ 、最大震度5)では、負傷者57人、住家被害7,423棟などの被害が生じた。また、この地震により大分県の蒲江で240cm (最大全振幅)の津波を観測した (被害と津波は「日本被害地震総覧」による)。

## 領域b内のM-T図及び回数積算図



## 領域c内のM-T図




- ※ 震央分布図中の黒色の点線及び断面図中の水色の点線は、Hirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)による、断面図中のオレンジ色の点線は内閣府 (2011)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。
- ※ 震央分布図中の青色の点線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

気象庁作成


# 1月22日 日向灘の地震 (波形相関DD法による震源分布)

期間: 1月22日~1月24日  
M: 0.0以上


震央分布図



震央分布図



投影面(A~E)毎の断面図




※断面図は各投影面(3km間隔に配置)から±1.5km以内の震源を表示  
※1/22 M6.6の地震を前面に表示



# 1月22日 日向灘の地震 (波形相関DD法による震央分布に発震機構分布を重ねて表示)

発震機構分布、震央分布図




○発震機構(1/22~1/31)は、波形相関DD法により再計算した震央の位置に表示。「1/22 01:08 M6.6」及び「1/22 05:31 M4.7」はCMT解、その他の地震は初動解。

○震央分布(1/22~1/24)は、M0.0以上の波形相関DD法により再計算した震源。

- ・発震機構は震源よりも大きく表示。
- ・桃色丸で囲った発震機構(初動解)は参考解(解が不安定)

震源再計算に使用した観測点




# 令和4年1月22日01時08分頃の地震の発震機構解 CMT解

西北西 - 東南東方向に張力軸を持つ型

CMT解

Mw=6.4



セントロイドの位置

北緯 32度45分

東経 132度4分

深さ 約35km

セントロイドの位置とは、地震の断層運動を1点で代表させた場合の位置。


下半球等積投影法で描画

P：圧力軸の方向




T：張力軸の方向

## 発震機構解〔CMT解〕について


圧力軸に注目した場合の例




逆断層型



横ずれ断層型




左横ずれ






右横ずれ


張力軸に注目した場合の例




正断層型



横ずれ断層型



右横ずれ



左横ずれ



圧力 (押す力)



張力 (引く力)



断層がずれる方向

ルーチンCMT  
GOOD


Mw6.4

震源報 Mj6.6 (深さ45km)

2022/01/22 01:08:37 HYUGANADA REGION

セントロイド震央距離 : 5km

セントロイドの深さ : 37km



セントロイド

緯度:32.76, 経度:132.06, 深さ:36.8km, 時刻:5.4秒

モーメント:5.01e+18N・m

バリエーションリダクション:82.8%,  $\epsilon$ :0.05

Str/Dip/Slip:335.37/23.48/-144.21, 211.89/76.52/-70.59

観測点数:27, チャンネル数:74

最大方位角差:88.0度

2022/01/24 19:01:02 出力

モーメントマグニチュード (Mw) の種類:




正断層



逆断層




横ずれ




(JMACMT) 2022/01/22 01:08:37.00 HYUGANADA REGION


M6.6 (b01)




Vertical




Radial



Transverse




# 土佐清水松尾観測点のひずみ変化



土佐清水松尾は産業技術総合研究所のひずみ計である。

気象庁作成

# 須崎大谷観測点のひずみ変化




須崎大谷は産業技術総合研究所のひずみ計である。

気象庁作成



# 西予宇和観測点のひずみ変化





西予宇和は産業技術総合研究所のひずみ計である。

気象庁作成

# 深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべりの全体概要

深部低周波地震(微動)の震央分布図と短期的ゆっくりすべりの断層モデル  
(2021年12月23日～2022年1月31日)

領域a(点線矩形)内の深部低周波地震(微動)の時空間分布図(A-B投影)



主な深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

活動場所		深部低周波地震(微動)活動の期間	短期的ゆっくりすべりの期間と規模
(1)	四国西部	12月28日～1月17日	(1-1) 1月1日00時～1月4日24時 : Mw5.9 (1-2) 1月5日00時～1月7日24時 : Mw5.9
(2)	東海	1月14日～(継続中)	(2-1) 1月15日00時～1月19日24時 : Mw5.7 (2-2) 1月20日00時～1月23日24時 : Mw5.7


● : 深部低周波地震(微動)の震央(気象庁の解析結果を示す)  
 □ : 短期的ゆっくりすべりの断層モデル(気象庁の解析結果を示す)  
 点線は、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるフィリピン海プレート上面の深さ(10kmごとの等深線)を示す。

気象庁作成


# 深部低周波地震（微動）活動（2012年2月1日～2022年1月31日）

深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。


震央分布図（2012年2月1日～2022年1月31日：過去10年間  
2022年1月1日以降の震源を○で表示）



上図領域a内の時空間分布図（A-B投影）




（2021年2月1日～2022年1月31日：過去1年間）



※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

# 深部低周波地震（微動）活動（2000年1月1日～2021年12月31日）

深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。




※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更(Matched Filter法の導入)により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。  
 ※時空間分布図中、灰色の期間は、それ以降と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。

# スタッキングによるプレート境界のすべりの監視


2021年12月1日～2022年1月31日

(2021年12月28日以降を濃く表示)



破線はフィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
 青丸はスタッキングにより検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法(注)で得られた低周波微動の震央を示す。  
 赤矩形は気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示す。  
 ×はスタッキング監視点を示す。

## 上図の時空間分布図



青丸はスタッキングにより検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法(注)で得られた低周波微動の震央を示す。  
 赤矩形は気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示し、上に表示されている数字は解析されたMwを示す。  
 (注) 防災科学技術研究所, 東京大学地震研究所との共同研究による成果

スタッキングデータは、上図の各監視点について、宮岡・横田(2012)の手法により、気象庁、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び静岡県のひずみ計データを基に作成している。

48時間階差のスタッキングデータのS/N比と、元データの観測値と理論値の一致度から有意な変化を検出している。  
 <参考>

- ・宮岡一樹・横田崇(2012): 地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発, 地震, 2, 65, 205-218.
- ・露木貴裕・他(2017): 新しい地震活動等総合監視システム(EPOS)における地殻変動監視手法の改善, 験震時報, 81, 5.

気象庁作成

# 東海の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

1月14日以降、東海で深部低周波地震(微動)を観測している。

深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測している。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図(2018年4月1日~2022年1月31日、

深さ0~60km、Mすべて)


灰:2018年4月1日~2022年1月13日、

青:2022年1月14日~1月19日

赤:2022年1月20日以降





領域a内の時空間分布図(A-B投影)



# 東海で観測した短期的ゆっくりすべり(1月15日～23日)


愛知県から静岡県で観測されたひずみ変化



豊橋多米、西尾善明及び津安濃は産業技術総合研究所の、浜松春野は静岡県のひずみ計である。

気象庁作成

# 東海で観測した短期的ゆっくりすべり(1月15日~23日)



前図に観測されたひずみ観測点での変化量を元にすべり推定を行ったところ、低周波地震とほぼ同じ場所にすべり域が求まった。


断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。  
 ・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。  
 ・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。



# 東海～紀伊半島 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2019年1月1日～2022年1月31日

(2021年12月28日以降を濃く表示)



破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示す。

## 上図の時空間分布図



短期的ゆっくりすべりの解析には、気象庁、産業技術総合研究所及び静岡県データのデータを用いている。  
赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。  
青丸はエンベロップ相関法(防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果)で得られた低周波微動の震央を示す。

気象庁作成

# 四国西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

2021年12月28日から2022年1月17日にかけて、四国西部で深部低周波地震(微動)を観測した。深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

## 深部低周波地震(微動)活動


震央分布図

(2018年4月1日～2022年1月24日、深さ0～60km、Mすべて)


灰: 2018年4月1日～2021年12月27日、

青: 2021年12月28日～2022年1月4日、


赤: 2022年1月5日以降



領域a内の時空間分布図(A-B投影)




2021年12月23日～2022年1月24日




気象庁作成

# 四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(1月1日～7日)

愛媛県から高知県で観測されたひずみ変化




西予宇和及び須崎大谷は産業技術総合研究所のひずみ計である。



参考

第1段階のグリッドサーチによる決定係数の分布 (1に近いほど観測値を良く説明する)



参考

左図に観測されたひずみ観測点での変化量を元にすべり推定を行ったところ、低周波地震とほぼ同じ場所にすべり域が求まった。


断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。  
 ・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。  
 ・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。

気象庁作成

# 四国 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2019年1月1日 ~ 2022年1月31日

(2021年12月28日以降を濃く表示)



破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。  
赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル(参考解を含む)を示す。

## 上図の時空間分布図



短期的ゆっくりすべりの解析には、産業技術総合研究所のデータを用いている。

赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。

青丸はエンベロープ相関法(防災科学技術研究所, 東京大学地震研究所との共同研究による成果)で得られた低周波微動の震央を示す。


気象庁作成

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±6km未満の地震を表示している。  
日向灘の領域e内のみ、深さ20km～30kmの地震を追加している。

震央分布図

(2021年8月1日～2022年1月31日、M全て、2022年1月の地震を赤く表示)



南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図(A-B投影)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間の地震のうち、M3.2以上の地震で想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震に吹き出しを付している。吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差(+は浅い、-は深い)を示す。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

# プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±6km未満の地震を表示している。

震央分布図の各領域内のMT図・回数積算図


領域a内(東海)




領域b内(紀伊半島)



領域c内(四国)



領域d内(日向灘)




※M全ての地震を表示していることから、検知能力未満の地震も表示しているため、回数積算図は参考として表記している。

気象庁作成


# 想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震

震央分布図(1987年9月1日～2022年1月31日、M $\geq$ 3.2、2022年1月の地震を赤く表示)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間に発生した地震(赤)、日向灘のM6.0以上、その他の地域のM5.0以上の地震に吹き出しを付けている。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。
- ・吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差を示す。+は浅い、-は深いことを示す。
- ・吹き出しに「CMT」と表記した地震は、発震機構解と深さはCMT解による。Mは気象庁マグニチュードを表記している。
- ・発震機構解の解析基準は、解析当時の観測網等に応じて変遷しているため一定ではない。

南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図



プレート境界型の地震と類似の型の発震機構解を持つ地震は以下の条件で抽出した。


**【抽出条件】**

- ・M3.2以上の地震
- ・領域a内(南海トラフの想定最大規模の想定震源域内)で発生した地震
- ・発震機構解が以下の条件を全て満たしたものを抽出した。
  - P軸の傾斜角が45度以下
  - P軸の方位角が65度以上180度以下(※)
  - T軸の傾斜角が45度以上
  - N軸の傾斜角が30度以下
- ※以外の条件は、東海地震と類似の型を抽出する条件と同様
- ・発震機構解は、CMT解と初動解の両方で検索をした。
- ・同一の地震で、CMT解と初動解の両方がある場合はCMT解を選択している。
- ・東海地方から四国地方(領域a)は、フィリピン海プレート上面の深さから±10km未満の地震のみ抽出した。日向灘(領域b)は、+10km～-20km未満の震源を抽出した。CMT解はセントロイドの深さを使用した。

気象庁作成

# 南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動状況


## ◆地震活動状況の監視・評価を行っている領域



- \* 活動の監視・評価を行っている領域に番号を付している。
- \* Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるプレート境界の等深線を破線で示す。
- \* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

## ◆監視・評価に使用している指標等について


ETAS( $\sigma$ 値) …理論上の地震活動からのずれ




地震活動指数

…基準期間の活動と比較し、活発か静穏かを示す指標

活動指数 (120日間の時間窓を40日間ずつシフト)



b値 …地震の規模 (M) の相対分布



地震回数の指数化

指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	ほぼ平常
4	40	
3	15	やや少ない
2	10	
1	4	少ない
0	1	

気象庁作成



# 南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動指数

2022年1月31日


領域	①静岡県 中西部		②愛知県		③浜名湖 周辺	④駿河 湾	⑤ 東海	⑥東南 海	⑦ 南海
	地	プ	地	プ	プ	全	全	全	全
地震活動指数	4	2	4	4	2	4	5	5	4
平均回数	16.4	18.4	26.6	13.7	13.3	13.2	18.2	19.7	21.5
MLきい値	1.1		1.1		1.1	1.4	1.5	2.0	2.0
クラスタ 除去	距離	3km		3km		3km	10km	10km	10km
	日数	7日		7日		7日	10日	10日	10日
対象期間	60日	90日	60日	30日	360日	180日	90日	360日	90日
深さ	0~ 30km	0~ 60km	0~ 30km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 60km	0~ 100km	0~ 100km

領域	南海トラフ沿い		⑪日向 灘	⑫紀伊 半島	⑬和歌 山	⑭四国	⑮紀伊半 島	⑯四国
	⑧東側	⑩西側	全	地	地	地	プ	プ
	全	全	全	地	地	地	プ	プ
地震活動指数	7	3	5	7	5	5	6	7
平均回数	12.6	14.6	20.7	23.0	41.7	30.9	27.8	28.1
MLきい値	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
クラスタ 除去	距離	10km	10km	10km	3km	3km	3km	3km
	日数	10日	10日	10日	7日	7日	7日	7日
対象期間	720日	360日	60日	120日	60日	90日	30日	30日
深さ	0~ 100km	0~ 100km	0~ 100km	0~ 20km	0~ 20km	0~ 20km	20~ 100km	20~ 100km

\* 基準期間は、全領域1997年10月1日～2022年1月31日

\* 領域欄の「地」は地殻内、「プ」はフィリピン海プレート内で発生した地震であることを示す。ただし、震源の深さから便宜的に分類しただけであり、厳密に分離できていない場合もある。「全」は浅い地震から深い地震まで全ての深さの地震を含む。

\* ⑨の領域(三重県南東沖)は、2004年9月5日以降の地震活動の影響で、地震活動指数を正確に計算できないため、掲載していない。



地震活動指数を計算した領域

地震活動指数と地震数

地震回数の指数化		
指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	
6	10	やや多い
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	
2	10	やや少ない
1	4	
0	1	少ない









\* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

\* Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

気象庁作成

# 地震活動指数一覧

2022年01月31日




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成


# 地震活動指数一覽

2022年01月31日

( 7 ) 南海




( 11 ) 日向灘




( 8 ) 南海トラフ沿い(東側)




( 12 ) 紀伊半島(地殻内)




( 9 ) 南海トラフ沿い(三重県沖)




( 13 ) 和歌山(地殻内)



( 10 ) 南海トラフ沿い(西側)




( 14 ) 四国(地殻内)




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率(%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成

( 1 5 ) 紀伊半島 (プレート内)



( 1 6 ) 四国 (プレート内)




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	← 平常		多					

## ひずみ計による観測結果（2021年8月1日～2022年1月31日）

短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。

- SSE1：2021年9月16日から17日にかけて観測された。（第48回評価検討会資料参照）
- SSE2：2021年9月21日から22日にかけて観測された。（第48回評価検討会資料参照）
- SSE3：2021年11月2日から4日にかけて観測された。（第50回評価検討会資料参照）
- SSE4：2021年11月27日から30日にかけて観測された。（第51回評価検討会資料参照）
- SSE5：2021年12月1日から2日にかけて観測された。（第51回評価検討会資料参照）
- SSE6：2021年12月3日から4日にかけて観測された。（第51回評価検討会資料参照）
- SSE7：2021年12月8日から10日にかけて観測された。（第51回評価検討会資料参照）
- SSE8：2021年12月11日から13日にかけて観測された。（第51回評価検討会資料参照）
- SSE9：2022年1月15日から19日にかけて観測された。（第52回評価検討会資料参照）
- SSE10：2022年1月20日から23日にかけて観測された。（第52回評価検討会資料参照）


ひずみ計の配置図



※観測点名の記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。  
 ※観測点名の下の「D/day(/M)」は、一日あたりのトレンド変化量をDとして補正していること  
 及び縮尺を1/M倍にして表示していることを示す。  
 ※観測点名、観測成分名右側の縦棒は、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。  
 ※多成分ひずみ計成分名の( )内は測定方位、[ ]内は面積ひずみ計算に用いた成分を示す。  
 ※多成分ひずみ計の最大剪断ひずみ、面積ひずみ及び主軸方向は、広域のひずみに換算して算出している。

東海地域（西部） ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気（面積ひずみ）補正データ




- SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.16-09.17
- SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.21-09.22
- SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04
- SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.27-11.30
- SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.01-12.02
- SSE6 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.03-12.04
- SSE7 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.08-12.10
- SSE8 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.11-12.13
- SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19
- SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整

東海地域（西部） ひずみ変化 日値

Exp. ↑ 10000 nstrain  
200 mm




面積ひずみは、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

東海地域（東部） ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気（面積ひずみ）補正データ

Exp.  
↑ 300 nstrain  
30 hPa  
100 mm/day




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害

東海地域（東部） ひずみ変化 日値


Exp.  
↑ 10000 nstrain  
200 mm



面積ひずみは，地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


### 掛川富部 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



### 掛川富部 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は  
ひずみ 1・2・3の各方向成分から1999年7月1日を基点として算出






### 浜松春野 ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気補正データ




SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04  
SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19  
SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

C : 地震に伴うステップ状の変化  
L : 局所的な変化  
S : 例年見られる変化  
M : 調整  
T : 障害



### 浜松春野 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は ひずみ 2・3・4 の各方向成分から2003年1月1日を基点として算出



最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


### 浜松佐久間 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




- SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.16-09.17
- SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.21-09.22
- SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04
- SSE7 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.08-12.10
- SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19
- SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



### 浜松佐久間 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1・2・3の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出



最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


浜松宮口 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04  
SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19  
SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

C : 地震に伴うステップ状の変化  
L : 局所的な変化  
S : 例年見られる変化  
M : 調整  
T : 障害




浜松宮口 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は  
ひずみ 1・3・4の各方向成分から2002年7月1日を基点として算出




最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

静岡落合 ひずみ変化 時間値




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




静岡落合 ひずみ変化 日値



最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


藤枝蔵田 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




藤枝蔵田 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 6・7・8 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出




最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

### 掛川高天神 ひずみ変化 時間値




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




### 掛川高天神 ひずみ変化 日値




売木岩倉 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




- SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.16-09.17
- SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.21-09.22
- SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04
- SSE7 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.08-12.10
- SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19
- SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



売木岩倉 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ6・7・8の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出



最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


新城浅谷 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




- SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.16-09.17
- SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2021.09.21-09.22
- SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.02-11.04
- SSE7 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.08-12.10
- SSE8 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.11-12.13
- SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19
- SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



新城浅谷 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ 2・3・4 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出




最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。



田原高松 ひずみ変化 時間値


・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ

Exp. ↑ 200 nstrain  
30 hPa  
50 mm/day



- SSE4 : 短期的ゆっくりすべり 2021.11.27-11.30
- SSE5 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.01-12.02
- SSE6 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.03-12.04
- SSE7 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.08-12.10
- SSE8 : 短期的ゆっくりすべり 2021.12.11-12.13
- SSE9 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.15-01.19
- SSE10 : 短期的ゆっくりすべり 2022.01.20-01.23

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害




- 水平ひずみ 1 (N065E) : 1.500e-09/day
- 水平ひずみ 5 (N065E) : -7.100e-09/day
- 水平ひずみ 2 (N155E) : -3.300e-09/day
- 水平ひずみ 6 (N155E) : 1.400e-09/day
- 水平ひずみ 3 (N200E) : -8.200e-09/day
- 水平ひずみ 7 (N200E) : -6.000e-09/day
- 水平ひずみ 4 (N290E) : -1.100e-08/day
- 水平ひずみ 8 (N290E) : -8.300e-10/day
- 面積ひずみ[12] : -1.500e-09/day
- 面積ひずみ[56] : -4.200e-09/day
- 面積ひずみ[34] : -1.700e-08/day
- 面積ひずみ[78] : -6.000e-09/day
- 気圧
- ひずみ雨
- ひずみ 5・6・7成分から 3ヶ月前を基点として算出
- ←→ 伸び
- ↔ 縮み
- 1.0e-06 strain

田原高松 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出

Exp. ↑ 10000 nstrain




最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


# 多成分ひずみ計日値による主ひずみ解析結果

(90日間の変化量から算出)


観測点配置図




基準日：2020/07/03 比較日：2020/10/01




基準日：2020/10/03 比較日：2021/01/01




基準日：2021/01/01 比較日：2021/04/01




基準日：2021/04/02 比較日：2021/07/01




基準日：2021/07/03 比較日：2021/10/01



基準日：2021/10/03 比較日：2022/01/01



基準日：2021/11/02 比較日：2022/01/31



## 南海トラフ沿いの長期的スロースリップの客観検知

客観検知手法 (Kobayashi, 2017<sup>1)</sup>) は、国土地理院 GEONET の GNSS 座標値 F3 解を用いて、長期的スロースリップに伴う変位を南海トラフに沿った経度別に以下の手順により検出したものである。

(1) 観測点の成分ごとに直線トレンド、アンテナ交換などに伴うオフセットと主な地震に伴うオフセット、年周・半年周成分を除去する。

(2) 長期的 SSE の影響がほぼ見られない中国地方の観測点の共通ノイズを全点から引き去り、中国地方全体を固定する。

(3) 各観測点の水平成分からフィリピン海プレート沈み込みと逆方向 (S55E) の成分を計算し、南海トラフ沿いのプレート等深線 25 km に沿って設定した経度 0.1 度間隔の地点を中心とする 50×100 km の矩形範囲内の各観測点の成分の平均値を求める。

(4) 主な地震の余効変動を除去する。

(5) 地点ごとの時系列と 1 年の傾斜期間を持つランプ関数との相互相関と、対象期間前後の 2 年間変化量を求める。

なお処理の仕様上、最新期間については、今後データ追加に伴い解析結果が変わる可能性がある。図に示された高相関の時空間分布は、変動源の位置自体ではなく変化が見られた範囲を意味している。

また、プレート境界上に置いた矩形断層でのすべりによる理論変位と比較することにより、以下の手順で長期的スロースリップの規模を推定した (小林, 2021<sup>2)</sup>)。


(6) 南海トラフ沿いのプレート等深線 25 km に沿って設定した経度 0.1 度間隔の地点を中心とする 30×30 km の矩形断層上に 100 mm のすべりを与え、理論変位を Okada (1992) により計算する。

(7) 計算地点を中心とする地表上の 50×100 km の矩形範囲内の観測点における、(6)の理論変位の沈み込み方向と逆方向に投影した成分の理論平均変位を求める。

(8) 手順(5)で求めた 2 年間の観測変位量と、手順(7)で求めた一定のすべり量を与えた場合の理論変位値とを比較する。このとき、2 年間の観測変位量が大きい/小さい場合でも、単純化のためすべりの範囲は(6)で設定した矩形断層上にあると仮定する。矩形断層上のすべり量と地表変位量とは比例関係にあるため、2 年間の観測変位量から 2 年間あたりのすべり量を求めることができ、対応する Mw を算出する。

1) Kobayashi, A., 2017, Objective detection of long-term slow slip events along the Nankai Trough using GNSS data (1996–2016), *Earth Planets Space*, 69:171, doi:10.1186/s40623-017-0755-7.


2) 小林昭夫, 2021, GNSS による長期的スロースリップ客観検出手法の応用—短期的スロースリップの検出と長期的スロースリップの規模推定—, 気象研究所研究報告, 69, 1-14



**第1図 長期的スロースリップに伴う変位の時空間図**

スロースリップに伴う非定常変位の範囲（場所、時間）を赤～黒で示す。色が濃いほどスロースリップの発生可能性が高い。右端の縦線は最新データ日を示す。

- T1:東海 2000～2005 年、T2:東海 2013～2016 年、SH:志摩半島 2017～2018 年、2019～2020 年
- K1:紀伊水道 1996～1997 年、K2:紀伊水道 2000～2002 年、K3:紀伊水道 2014～2016 年、K4:紀伊水道 2019 年～
- S1:四国西部 2005 年、S2:四国中部 2019 年～
- B1:豊後水道 1996～1997 年、B2:豊後水道 2003 年、B3:豊後水道 2010 年、B4:豊後水道 2014 年、B5:豊後水道 2018～2019 年





第2図 長期的スロースリップの規模分布

2年間あたりの変化量から推定したモーメントマグニチュード。地域略号は第1図と同じ。

# 東海・東南海地域の海底津波計記録の長期変化

海底津波計 日値 (潮汐補正データ)  
2008/01/01 - 2022/01/30

隆起  
↑ 1000 mm  
↓ 沈降



気象庁作成